



## FISICA

Después de leer atentamente el examen, responda cuatro preguntas cualesquiera a elegir entre las ocho que se proponen.


TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Todas las preguntas se calificarán con un máximo de 2,5 puntos.

El estudiante deberá indicar la agrupación de preguntas que responderá. La selección de preguntas deberá realizarse conforme a las instrucciones planteadas, no siendo válido seleccionar preguntas que sumen más de 10 puntos, ni agrupaciones de preguntas que no coincidan con las indicadas, lo que puede conllevar la anulación de alguna pregunta que se salga de las instrucciones.

1. La aceleración de la gravedad en la superficie de Urano tiene un valor de  $8.9 \text{ m/s}^2$ . Calcule:
  - a. El radio medio de Urano. (0.75 puntos)
  - b. El peso en Urano de un objeto cuyo peso en la superficie de la Tierra es 1100 N. (0.75 puntos)
  - c. La velocidad de escape de la superficie de Urano. (1 punto)Datos:  $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$ ;  $R_T = 6370 \text{ km}$ ,  $M_T = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$ ;  $M_U = 8.68 \times 10^{25} \text{ kg}$
2. Un satélite para comunicaciones se encuentra describiendo una órbita circular alrededor de la Tierra con una velocidad de 6000 m/s. Calcule:
  - a. ¿A qué distancia sobre la superficie de la Tierra se desplaza el satélite? (0.75 puntos)
  - b. ¿A qué velocidad se desplazaría si estuviera moviéndose en torno a Venus describiendo una órbita circular a una distancia de 900 km sobre la superficie de dicho planeta? (0.75 puntos)
  - c. La distancia entre los centros de Venus y la Tierra es de 0.27 UA. ¿En qué punto de la recta que los une la intensidad del campo gravitatorio terrestre anularía a la del venusiano? Dibuja ambos campos en dicho punto (1 punto)Datos:  $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$ ;  $R_T = 6370 \text{ km}$ ;  $M_T = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$ ;  $R_V = 6052 \text{ km}$ ;  $M_V = 4.87 \times 10^{24} \text{ kg}$ ;  $1 \text{ UA} = 1.50 \times 10^{11} \text{ m}$
3. Dos cargas puntuales positivas,  $q_1 = +10 \mu\text{C}$  y  $q_2 = +5 \mu\text{C}$ , están situadas a una distancia mutua de 1 m. Llamemos A al punto medio situado a lo largo de la línea imaginaria que conecta las dos cargas.
  - a. Calcule el módulo, la dirección y el sentido del campo eléctrico en el punto A. (1 punto)
  - b. Calcule el potencial eléctrico en el punto A. (1 punto)
  - c. Si colocamos una carga puntual negativa,  $q = -2 \mu\text{C}$ , en el punto A, calcule el módulo, la dirección y el sentido de la fuerza ejercida sobre dicha carga. (0.5 puntos)Dato:  $K = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$
4. Una partícula alfa  $\alpha$  viaja en línea recta con velocidad constante y entra en una región donde existen un campo eléctrico y un campo magnético constantes, mutuamente perpendiculares y a su vez perpendiculares a la trayectoria de la partícula alfa. La magnitud del campo eléctrico es de  $2 \times 10^5 \text{ N/C}$  y la del campo magnético 0.5 T. Calcule:
  - a. La velocidad de la partícula alfa si atraviesa dicha región sin modificar su trayectoria. (1 punto)
  - b. La diferencia de potencial necesaria para acelerar la partícula alfa desde el reposo hasta esa velocidad. (0.75 puntos)
  - c. Cómo se debe modificar el campo eléctrico (módulo, dirección y sentido) para que un electrón acelerado con la misma diferencia de potencial atraviese la región sin modificar su trayectoria. (0.75 puntos)Datos:  $|q_e| = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ;  $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ;  $m_\alpha = 6.64 \times 10^{-27} \text{ kg}$



5. Un pescador percibe que su barca se mueve periódicamente arriba y abajo impulsada por las olas en la superficie del mar. La barca tarda 3 s en desplazarse desde el punto más alto al punto más bajo, distantes entre sí 60 cm. En un instante dado la distancia entre dos crestas consecutivas de las olas es de 8 m.
- Calcule la velocidad a la que se desplazan las olas. (1 punto)
  - Escribe la ecuación de la onda asociada a las olas en la superficie del mar, considerando que en el instante inicial que se producen las olas, la barca del pescador tiene desplazamiento nulo respecto al mar en calma. (1.5 puntos)
6. Colocamos entre agua y aire un material de caras planas y paralelas que tiene un espesor de 5 cm y un índice de refracción desconocido. Incidimos desde el aire con un rayo de luz monocromática de 520 nm y un ángulo de incidencia de  $60^\circ$  en el material.
- Realice el trazado de rayos y determine el ángulo que forma el rayo con la superficie de separación entre el material y el agua (1.5 puntos)
  - La longitud de onda del rayo en el material y en el agua. (0.5 puntos)
  - El índice de refracción del material si con un ángulo de incidencia de  $80^\circ$  del rayo desde el agua sobre el material se produce reflexión total interna en el agua. (0.5 puntos)



Datos:  $n_{\text{agua}}=1.33$ ;  $n_{\text{aire}}=1$ ;  $c = 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

7. Conocemos la longitud de onda de los electrones que inciden sobre un material en un experimento de difracción de electrones,  $\lambda_e = 1.5 \times 10^{-10} \text{ m}$ . Calcule:
- La velocidad de los electrones que inciden sobre el material. (1 punto)
  - Determina la diferencia de energía entre dos niveles atómicos si la radiación emitida tiene la misma longitud de onda que la de los electrones empleados en la difracción (1 punto)
  - La longitud de onda de De Broglie asociada a una partícula de masa,  $m = 5 \times 10^{-12} \text{ kg}$  con la misma velocidad que el haz de electrones de los apartados anteriores (0.5 puntos)

Datos:  $|q_e| = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ;  $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ;  $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ;  $c = 3 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

8. Se conocen más de 40 isótopos del polonio, todos ellos radioactivos. Uno de ellos, el isótopo  $^{210}\text{Po}$ , decae a un isótopo estable del plomo (Pb) emitiendo una partícula alfa con un período de semidesintegración de 138.4 días.
- Escriba la reacción nuclear descrita en el enunciado anterior (0.5 puntos)
- Calcule para una muestra radiactiva de  $^{210}\text{Po}$ :
- La vida media y la constante de desintegración radiactiva. (1 punto)
  - El número de moles del isótopo radiactivo necesarios para una actividad inicial de  $1.75 \times 10^{13} \text{ Bq}$ . (1 punto)

Dato:  $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ átomos} \cdot \text{mol}^{-1}$



**La física tiene truco. Te enseñamos a resolver cualquier problema.**

selectividad.academy - 623 769 002



# Selectividad Academy

Tu academia de selectividad online

● Mejor academia online de selectividad

## Prueba sin compromiso

Primera clase gratis. Sin permanencia. Sin letra pequeña.

- ✓ Profesores especialistas en cada asignatura
- ✓ Clases adaptadas a tu nivel y tus objetivos
- ✓ Todos los exámenes oficiales resueltos paso a paso
- ✓ Calculadora de nota y guía completa en la web

**623 769 002**

Escríbenos por WhatsApp

[www.selectividad.academy](http://www.selectividad.academy)

→ Calcula tu nota en [selectividad.academy/calculadora-selectividad](http://selectividad.academy/calculadora-selectividad)

→ Guía completa en [selectividad.academy/guia-selectividad](http://selectividad.academy/guia-selectividad)

→ ¿Tienes dudas? Escríbenos sin compromiso