



Solo se corregirán los ejercicios claramente elegidos, en el orden que aparezcan resueltos, que no excedan de los permitidos y que no aparezcan totalmente tachados. En todo caso, se adaptará a lo dispuesto por la COEBAU.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

El alumno deberá contestar a 5 de las 10 preguntas, con sus problemas y cuestiones en cada caso.

La calificación máxima (entre paréntesis al final de cada pregunta) la alcanzarán aquellos ejercicios que, además de bien resueltos, estén bien explicados y argumentados, cuidando la sintaxis y la ortografía y utilizando correctamente el lenguaje científico, las relaciones entre las cantidades físicas, símbolos, unidades, etc.

DATOS GENERALES

Los valores de las constantes de equilibrio que aparecen en los problemas debe entenderse que hacen referencia a presiones expresadas en atmósferas y concentraciones expresadas en mol·L⁻¹.


El alumno deberá utilizar los valores de los números atómicos, masas atómicas y constantes universales que se le suministran con el examen.

- Dados los elementos A (Z = 17), B (Z = 19) y C (Z = 20), responda a las siguientes cuestiones:
 - Escriba sus configuraciones electrónicas ordenadas. (Hasta 0,6 puntos)
 - Ordene razonadamente estos elementos según el valor creciente del tamaño de sus átomos. (Hasta 0,5 puntos)
 - Razone cual será el ión más estable para cada uno de esos átomos. (Hasta 0,5 puntos)
 - Escriba la fórmula de un compuesto que contenga solamente los elementos A y C. Indique cual será el tipo de enlace que explique mejor sus propiedades. (Hasta 0,4 puntos)
- Cada comprimido de aspirina contiene 0,5 g de ácido acetilsalicílico, un ácido monoprótico débil de fórmula C₉H₈O₄ (de forma simplificada HA). Se disuelve un comprimido de aspirina en agua hasta formar 200 mL de disolución, se mide su pH y resulta ser 2,65.
 - Determine el valor de la constante de acidez de dicho ácido. (Hasta 1,0 puntos)
 - Explique si el pH de una disolución de la sal sódica del ácido acetilsalicílico es menor, igual o mayor que 7. Escriba los equilibrios necesarios para su explicación. (Hasta 1,0 puntos)
- Se introduce fosgeno (COCl₂) en un recipiente vacío de 2 L a una presión de 0,82 atm y a una temperatura de 227 °C, produciéndose su descomposición según el equilibrio:
COCl₂ (g) ⇌ CO (g) + Cl₂ (g) Sabiendo que en estas condiciones el valor de K_p vale 0,189, calcule:
 - La concentración inicial del fosgeno. (Hasta 0,2 puntos)
 - Las concentraciones de todas las especies en el equilibrio. (Hasta 1,2 puntos)
 - La presión parcial de cada uno de los componentes en el equilibrio (Hasta 0,6 puntos)
- El producto de solubilidad del Mn(OH)₂ es 4,6·10⁻¹⁴. Calcule:
 - La solubilidad del hidróxido de manganeso en g/L. (Hasta 1,0 puntos)
 - El pH de una disolución saturada de Mn(OH)₂. (Hasta 1,0 puntos)



Química paso a paso. Formulación, problemas y teoría clara.

selectividad.academy - 623 769 002

	Evaluación de Bachillerato para Acceder a estudios Universitarios Castilla y León	QUÍMICA	Texto para los Alumnos 3 páginas
--	--	----------------	---

5. A partir del 1-propanol (propan-1-ol) escriba la reacción de obtención de los compuestos de los apartados a, b y c. Formule y nombre todas las sustancias e indique en cada caso el tipo de reacción:
- 1-cloropropano (Hasta 0,7 puntos)
 - propeno. (Hasta 0,7 puntos)
 - ácido propanoico (Hasta 0,6 puntos)
6. Teniendo en cuenta la estructura y el tipo de enlace, justifique las siguientes afirmaciones:
- El cloruro de sodio tiene mayor punto de fusión que el bromuro de sodio. (Hasta 0,5 puntos)
 - El carbono en forma de diamante es un sólido muy duro. (Hasta 0,5 puntos)
 - El nitrógeno molecular presenta gran estabilidad química. (Hasta 0,5 puntos)
 - El amoníaco gaseoso es una molécula polar. (Hasta 0,5 puntos)
7. La reacción $A + 3B \rightarrow C$ es de primer orden respecto de A y de segundo orden respecto de B. Utilizando los datos de la tabla, calcule:
- La constante de velocidad con sus unidades correspondientes. (Hasta 0,5 puntos)
 - El orden total de la reacción y escriba la ecuación de la velocidad. (Hasta 0,5 puntos)
 - Los valores de las concentraciones que faltan en la tabla. (Hasta 1,0 puntos)

Experimento	[A] (mol·L ⁻¹)	[B] (mol·L ⁻¹)	V (mol·L ⁻¹ ·s ⁻¹)
1	0,10	0,30	0,030
2	0,60	0,120
3	0,30	0,090

8. Calcule:
- El pH de la disolución resultante de añadir 50 mL de ácido clorhídrico (HCl) 0,24 M a 50 mL de hidróxido de potasio (KOH) 0,2 M, suponiendo que los volúmenes son aditivos. (Hasta 1,0 puntos)
 - El volumen de HCl 0,5 M necesario para neutralizar 50 mL de KOH 0,2 M. (Hasta 1,0 puntos)
9. Responda a las siguientes cuestiones, escribiendo las reacciones que tienen lugar en cada electrodo:
- Se hace pasar una corriente eléctrica de 1,5 A a través de 250 mL de una disolución acuosa de iones Cu²⁺ 0,1 M. ¿Cuántos minutos tienen que transcurrir para que todo el cobre de la disolución se deposite como cobre metálico? (Hasta 1,0 puntos)
 - Determine el volumen de Cl₂ gaseoso, medido a 27 °C y 1 atm, que se desprenderá en el ánodo durante la electrólisis de una disolución acuosa de un cloruro metálico, aplicando una corriente de 4 A de intensidad durante 15 minutos. (Hasta 1,0 puntos)
10. Formule y nombre:
- Dos isómeros de posición de fórmula C₃H₈O. (Hasta 0,7 puntos)
 - Dos isómeros de función de fórmula C₃H₆O. (Hasta 0,7 puntos)
 - Dos isómeros de cadena de fórmula C₆H₁₂. (Hasta 0,6 puntos)



Calcula tu nota en selectividad.academy/calculadora-selectividad
Herramienta gratuita



Evaluación de Bachillerato para
Acceder a estudios universitarios

Castilla y León

QUÍMICA

EJERCICIO
Nº Páginas: 3

1. Tabla periódica de los elementos

		Grupos																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Períodos	1	1 H 1,01																	2 He 4,00		
	2	3 Li 6,94	4 Be 9,01																	9 F 19,00	10 Ne 20,18
3	11 Na 22,99	12 Mg 24,31																	16 S 32,06	17 Cl 35,45	18 Ar 39,95
4	19 K 39,10	20 Ca 40,08	21 Sc 44,96	22 Ti 47,87	23 V 50,94	24 Cr 52,00	25 Mn 54,94	26 Fe 55,85	27 Co 58,93	28 Ni 58,69	29 Cu 63,55	30 Zn 65,38	31 Ga 69,72	32 Ge 72,63	33 As 74,92	34 Se 78,97	35 Br 79,90	36 Kr 83,80			
5	37 Rb 85,47	38 Sr 87,62	39 Y 88,91	40 Zr 91,22	41 Nb 92,91	42 Mo 95,95	43 Tc 97	44 Ru 101,07	45 Rh 102,91	46 Pd 106,42	47 Ag 107,87	48 Cd 112,41	49 In 114,82	50 Sn 118,71	51 Sb 121,76	52 Te 127,60	53 I 126,90	54 Xe 131,29			
6	55 Cs 132,91	56 Ba 137,33	57 La 138,91	58 Hf 178,49	59 Ta 180,95	60 W 183,84	61 Re 186,21	62 Os 190,23	63 Ir 192,22	64 Pt 195,08	65 Au 196,97	66 Hg 200,59	67 Tl 204,38	68 Pb 207,2	69 Bi 208,98	70 Po 209	71 At 210	72 Rn 222			
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89 Ac [227]	90 Rf [267]	91 Db [270]	92 Sg [271]	93 Bh [270]	94 Hs [277]	95 Mt [276]	96 Ds [281]	97 Rg [282]	98 Cn [285]	99 Nh [285]	100 Fl [289]	101 Mc [289]	102 Lv [293]	103 Ts [294]	104 Og [294]			

Z	Número atómico
X	Símbolo
A _r	Masa atómica relativa

2. Constantes físico-químicas

Carga elemental (e) : $1,602 \cdot 10^{-19}$ C
 Constante de Avogadro (N_A) : $6,022 \cdot 10^{23}$ mol⁻¹
 Unidad de masa atómica (u) : $1,661 \cdot 10^{-27}$ kg
 Constante de Faraday (F) : 96490 C mol⁻¹
 Constante molar de los gases (R) : $8,314$ J mol⁻¹ K⁻¹ = $0,082$ atm dm³ mol⁻¹ K⁻¹

3. Algunas equivalencias

1 atm = 760 mmHg = $1,013 \cdot 10^5$ Pa
 1 cal = $4,184$ J
 1 eV = $1,602 \cdot 10^{-19}$ J



Selectividad Academy

Tu academia de selectividad online

● Mejor academia online de selectividad

Prueba sin compromiso

Primera clase gratis. Sin permanencia. Sin letra pequeña.

- ✓ Profesores especialistas en cada asignatura
- ✓ Clases adaptadas a tu nivel y tus objetivos
- ✓ Todos los exámenes oficiales resueltos paso a paso
- ✓ Calculadora de nota y guía completa en la web

623 769 002

Escríbenos por WhatsApp

www.selectividad.academy

→ Calcula tu nota en selectividad.academy/calculadora-selectividad

→ Guía completa en selectividad.academy/guia-selectividad

→ ¿Tienes dudas? Escríbenos sin compromiso